

## Новые сведения о распространении и численности трёх видов альбатросов на кочёвках в Охотском море

Ю.Н.Глущенко, Д.В.Коробов, О.А.Бурковский

Юрий Николаевич Глущенко. Дальневосточный Федеральный университет, Школа педагогики, ул. Некрасова, д. 35, Уссурийск, 692500, Россия. E-mail: yu.gluschenko@mail.ru

Дмитрий Вячеславович Коробов. Амуро-Уссурийский Центр биоразнообразия птиц, Владивосток, 690022, Россия. E-mail: dv.korobov@mail.ru

Олег Александрович Бурковский. Дальневосточный Федеральный университет, Учебно-научный музей, Океанский проспект, 37, Владивосток, 690091, Россия. E-mail: burkovskiy.oa@dvvfu.ru

Поступила в редакцию 30 марта 2015

Во время внегнездовых кочёвок воды Охотского моря в разном числе посещают три вида альбатросов: белоспинный *Phoebastria albatrus* (Pallas, 1769), темноспинный *Ph. immutabilis* (Rothschild, 1893) и черноногий *Ph. nigripes* (Audubon, 1839) (Бианки 1913; Судиловская 1956; Шунтов 1972, 1998; и др.). Судя по картам, имеющимся в известных публикациях, в область их кочёвок входит вся акватория Охотского моря (del Hooy, Collar 2014) или значительная её часть (Шунтов 1982; 1998; Артюхин, Бурканов 1999). В то же время конкретных данных о местах встреч этих птиц здесь очень мало. При этом чаще всего указаны находки этих птиц у берегов Сахалина (Глущенко 2003; Глущенко и др. 2013), либо в районах Камчатки и Курильской гряды (Шунтов 1998; Артюхин 1999, 2003), в то время как для центральных и северных районов Охотского моря (в частности, для акватории, прилегающей к берегам Магаданской области) они и вовсе отсутствуют.

Летом и осенью 2014 года авторами статьи проводились судовые наблюдения морских птиц преимущественно в северном сегменте Охотского моря, а также на нескольких транзитных переходах к данной акватории от берегов Сахалина. Во время переходов, осуществлявшихся вдоль южных и восточных берегов Сахалина и далее через центральные районы Охотского моря, суда следовали со скоростью 7-10 узлов, а в месте основных работ в его северных районах их скорость обычно не превышала 4 узлов. При проведении наблюдений использовались 8-кратные бинокли и цифровые фотоаппараты различных моделей с длиннофокусными объективами (в разных случаях от 350 до 600 мм). Учитывая сравнительно небольшие размеры судов и небольшую скорость их движения, условия для наблюдений, которые проводились в течение всего светлого времени суток, были весьма благоприятными.

Все наблюдатели работали на разных судах и чаще всего в разные промежутки времени, которые частично перекрывались, а в целом пе-

риод исследований длился с 26 июня по 26 сентября. Д.В.Коробов вёл наблюдения в период с 26 июня по 8 августа (в том числе с 26 июня по 2 июля на переходе из порта Корсаков до места работ). Ю.Н.Глущенко работал в период с 22 июля по 3 сентября (в том числе на переходах от пролива Лаперуза к месту основных работ с 22 по 27 июля и в обратном направлении с 28 августа по 3 сентября). О.А.Бурковский проводил исследования с 24 августа по 26 сентября (в том числе на переходах из порта Корсаков до места работ с 24 по 28 августа и в обратном направлении с 22 по 26 сентября). За весь период работ 2014 года авторам удалось суммарно зарегистрировать 131 особь альбатросов трёх видов.

Белоспинный альбатрос  
*Phoebastria albatrus* (Pallas, 1769)

Судя по литературным сведениям, вне периода размножения белоспинный альбатрос кочует как в глубоководных, так и в шельфовых районах, тяготея к окраинам океана и морям, где держится в основном вдоль бровки континентального шельфа и подводного склона над глубинами 150-200 м (Шунтов 1998; Hasegawa, DeGange 1982; McDermont, Morgan 1993). Полученные нами данные вполне вписываются в указанные биотопические предпочтения этого вида: белоспинных альбатросов чаще всего мы отмечали в сравнительно мелководной зоне северной части Охотского моря, где проходили наши основные наблюдения, но две особи были встречены на переходах от этой акватории к берегам Сахалина (рис. 1).




Рис. 1. Места встреч белоспинного альбатроса *Phoebastria albatrus* в акватории Охотского моря в 2014 году.

Всего за период наблюдений было отмечено 9 одиночных белоспанных альбатросов, один из которых оказался взрослым, 7 были первогодками (рис. 2), а ещё один носил третий промежуточный наряд (табл. 1).

Таблица 1. Сведения о встречах белоспального альбатроса *Phoebastria albatrus* в Охотском море в 2014 году

№ п/п	Дата	Координаты		Возраст птицы	Наблюдатель
		Широта	Долгота		
1	11.07	58°13,06'	148°42,77'	Первогодок	Д.В.Коробов
2	13.07	58°19,66'	147°59,60'	Первогодок	Д.В.Коробов
3	23.08	58°39,04'	147°38,32'	Первогодок	Ю.Н.Глуценко
4	25.08	58°32,58'	144°44,84'	Первогодок	Ю.Н.Глуценко
5	29.08	56°02,53'	145°05,81'	Взрослый	Ю.Н.Глуценко
6	13.09	58°17,98'	148°46,65'	Первогодок	О.А.Бурковский
7	16.09	58°17,88'	148°51,95'	Первогодок	О.А.Бурковский
8	20.09	58°17,62'	148°17,07'	Первогодок	О.А.Бурковский
9	23.09	55°16,43'	145°52,99'	3 года	О.А.Бурковский



Рис. 2. Первогодок белоспального альбатроса *Phoebastria albatrus*. Северный сегмент Охотского моря, 23 августа 2014. Фото Ю.Н.Глуценко.

Единственная взрослая особь в окончательном наряде зарегистрирована 29 августа у свала глубин банки Кашеварова, когда она на короткое время приблизилась к проходящему судну, затем села в кильватерную струю, присоединившись к кормящейся здесь группировке глупышей *Fulmarus glacialis* и чаек *Larus schistisagus*, *Rissa tridactyla*, но вскоре взлетела и «исчезла» в набежавшей полосе тумана.

Следует отметить, что в середине XIX века в период кочёвок белоспанный альбатрос был обычен у берегов Сахалина (Мицуль 1873; Су-

пруненко 1890; Бианки 1913; Munsterhjelm 1922). Его также отмечали у побережий Приморского края (Taczanowski 1891-1893), а на север кочёвки простирались до Чукотского полуострова (Портенко 1972). В дальнейшем из-за катастрофического сокращения численности мировой популяции в дальневосточных морях России он стал встречаться крайне редко. Так, за весь период с начала 1950-х годов по 2013 год для Охотского моря и смежной тихоокеанской акватории, лежащей у Курильских островов, было известно 16 достоверных визуальных регистраций. В их числе 9 случаев обнаружения в прикурильских (Гизенко 1955; Слепцов 1959; Нечаев 1969; Артюхин 1997а,б, 2003; Ушакова 2004) и 7 – в присахалинских (Шунтов 1998; Глущенко 2003; Глущенко и др. 2013; данные Д.В.Коробова и Ю.Н.Глущенко) водах. Подавляющее большинство этих находок (за исключением двух) были сделаны в последние 20 лет (с 1995 по 2013 год). Дополняя эти сведения данными, собранными нами в 2014 году, создаётся впечатление о явном поступательном увеличении численности белоспинного альбатроса на рассматриваемой акватории, что вполне согласуется с общим ростом численности его мировой популяции (Артюхин и др. 2004; IUCN 2014).

### Темноспинный альбатрос *Phoebastria immutabilis* (Rothschild, 1893)

Самый многочисленный вид альбатросов в исследуемой акватории. В отличие от предыдущего вида, наиболее часто они нам встречались в открытых глубоководных районах Охотского моря при транзитных переходах от Сахалина к северному сегменту его акватории (рис. 3).




Рис. 3. Места встреч темноспинного альбатроса *Phoebastria immutabilis* в акватории Охотского моря в 2014 году.

Любопытно отметить, что имеющийся на вышеупомянутом северном (мелководном) сегменте акватории, «сгусток» встреч данного вида

(рис. 3а) во временном плане обязан исключительно осенним наблюдениям, в то время как в летние месяцы в этом сегменте не было отмечено ни одного экземпляра. Судя по всему, к осени темноспинный альбатрос в Охотском море имеет наиболее широкое распространение, отчасти занимая и его мелководные участки. Эту гипотезу подтверждают и наши многолетние наблюдения морских птиц у восточных побережий Сахалина, где данный вид регистрировался нами главным образом почти исключительно осенью.

Темноспинный альбатрос является единственным видом семейства, который был отмечен нами не только одиночными особями, но и рыхлыми группировками, когда одновременно можно было наблюдать несколько особей. Всего нам удалось насчитать 119 экземпляров, в их числе одиночные птицы были отмечены 81 раз, по две птицы – 11 раз, по 3 – 4 раза и один раз было отмечено сразу 4 особи. Таким образом, в среднем приходилось по 1.23 особи на одну встречу.



Рис. 4. Темноспинный альбатрос *Phoebastria immutabilis* в стадии интенсивной линьки. Центральная часть Охотского моря, 29 июня 2014. Фото Д.В.Коробова.

Визуальные наблюдения и отснятые фотоматериалы показали, что многие из встреченных нами птиц находились в состоянии интенсивной линьки всего оперения (рис. 4), что полностью соответствует известным данным о наличии линьки у этого альбатроса в летне-осенний период после сезона размножения (Шунтов, 1982).

Черноногий альбатрос  
*Phoebastria nigripes* (Audubon, 1839)

Судя по числу наших встреч, данный вид в настоящее время является самым малочисленным среди альбатросов в обследованных нами районах Охотского моря, отмеченный за весь период работ лишь три раза (табл. 2).

Таблица 2. Сведения о встречах черноногого альбатроса  
*Phoebastria nigripes* в Охотском море в 2014 году

№ п/п	Дата	Координаты		Наблюдатель
		Широта	Долгота	
1	25.08	46°50,41'	143°59,90'	О.А.Бурковский
2	09.09	58°17,54'	148°05,48'	О.А.Бурковский
3	12.09	58°19,74'	148°52,87'	О.А.Бурковский



Рис. 5. Места встреч черноногого альбатроса *Phoebastria nigripes*  
в акватории Охотского моря в 2014 году.

Следует отметить, что при исследованиях, проведённых В.П.Шунтовым (1998) в 1980-1990-е годы в западных частях Охотского моря, черноногий альбатрос встречен не был, хотя в 1940-1950-е годы он широко проникал не только в Охотское море, но и в сопредельные с проливом Лаперуза воды Японского моря (Слепцов 1959). О потенциальной возможности этого свидетельствует одна из трёх наших встреч с этим видом (25 августа) у юго-восточных берегов Сахалина (рис. 5).

Сравнение полученных данных с литературными сведениями находится в полном согласии с тем, что численность этого вида в недалёком прошлом сокращалась, а в последнее время подвержена некоторому росту, исходя из чего, он был внесён в категорию «near threatened» Красного списка МСОП-2014 (IUCN 2014).

Судя по окраске (целиком тёмные верхние и нижние кроющие хвоста) и отсутствию каких-либо признаков линьки (рис. 6), все встреченные особи, вероятно, являлись молодыми птицами.



Рис. 6. Черноногий альбатрос *Phoebastria nigripes*. Северный сегмент Охотского моря, 9 сентября 2014. Фото О.А.Бурковского.

### Л и т е р а т у р а

- Артюхин Ю.Б. 1997а. Встреча белоспинного альбатроса *Diomedea albatrus* в тихоокеанских водах Курильских островов // *Рус. орнитол. журн.* **6** (11): 18-19.
- Артюхин Ю.Б. 1997б. Повторная регистрация белоспинного альбатроса *Diomedea albatrus* в тихоокеанских водах Курильских островов // *Рус. орнитол. журн.* **6** (28): 4-5.
- Артюхин Ю.Б. 1999. Наблюдения белоспинного альбатроса *Diomedea albatrus* в прикамчатских водах Берингова и Охотского морей // *Биология и охрана птиц Камчатки* **1**: 115.
- Артюхин Ю.Б. 2003. Распределение и численность морских птиц в летний период в прибрежных районах Южной Камчатки и Курильских островов // *Биология и охрана птиц Камчатки* **5**: 13-26.
- Артюхин Ю.Б., Бурканов В.Н. 1999. *Морские птицы и млекопитающие Дальнего Востока России: полевой определитель*. М.: 1-215.
- Артюхин Ю.Б., Винников А.В., Терентьев Д.А. 2004. Морские птицы и ярусное рыболовство в западной части Берингова моря и тихоокеанских водах Камчатки // *Биология и охрана птиц Камчатки* **6**: 56-78.

- Бианки В.Л. 1913. *Columbiformes* и *Procellariiformes* // *Фауна России и сопредельных стран*. Птицы. Т. I, полутом 2. СПб.: 385-979.
- Гизенко А.И. 1955. *Птицы Сахалинской области*. М.: 1-328.
- Глушченко Ю.Н. 2003. Встречи двух видов альбатросов у берегов Сахалина // *Животный и растительный мир Дальнего Востока. Сер.: Экология и систематика животных*. Уссурийск, 7: 36-38.
- Глушченко Ю.Н., Коробов Д.В., Лебедев Е.Б. 2013. Новые встречи белоспинного *Phoebastria albatrus* и темноспинного *Ph. immutabilis* альбатросов у берегов Сахалина // *Рус. орнитол. журн.* 22 (836): 75-77.
- Мицуль М.С. 1873. *Очерк острова Сахалина в сельскохозяйственном отношении*. СПб: 1-159.
- Нечаев В.А. 1969. *Птицы Южных Курильских островов*. Л.: 1-246.
- Портенко Л.А. 1972. *Птицы Чукотского полуострова и острова Врангеля*. Л., 1: 1-424.
- Слепцов М.М. (1959) 2011. Трубноносые в районах китобойного промысла на северо-западе Тихого океана // *Рус. орнитол. журн.* 20 (704): 2244-2250.
- Судиловская А.М. 1956. Новые данные о трубконосых птицах // *Природа* 8: 107-109.
- Супруненко П.И. 1890. Фауна позвоночных острова Сахалин // *Каталог международной тюремной выставки*. СПб: 1-62.
- Ушакова М.В. 2004. Новые сведения об авифауне Южных Курильских островов // *Орнитология* 31: 67-75.
- Шунтов В.П. 1972. *Морские птицы и биологическая структура океана*. Владивосток: 1-378.
- Шунтов В.П. 1982. Отряд Трубноносые // *Птицы СССР. История изучения. Гагары, поганки, трубконосые*. М.: 352-427.
- Шунтов В.П. 1998. *Птицы дальневосточных морей России*. Владивосток, 1: 1-423.
- Del Hoyo J., Collar N.J. 2014. *HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Vol. 1. Non-Passeriformes*. Lynx Edicions, Barcelona: 1-903.
- Hasegava H., DeGange A.R. 1982. The Short-tailed Albatross, *Diomedea albatrus*, its status, distribution and natural history // *Amer. Birds* 36, 5: 806-814.
- McDermond D.K., Morgan K.H. 1993. Status and conservation of North Pacific albatrosses // *The status, ecology and conservation of marine birds of the North Pacific*. Ottawa: Can. Wildl. Serv. Spec. Publ.: 70-81.
- Munsterhjelm L. 1922. Some ornithological notes from a journey to Saghalien in 1914 // *Meddelanden fran Goteborgs Musei Zoologiska Avdelning*. Gotebord. № 13: 1-112.
- Taczanowski L. 1891-1893. Faune ornitologique de la Sibirie orientale // *Memoirs Academie des Sciences de St. Petersbourg*, Serie VII 39: 1-1278.
- IUCN 2014. *The IUCN Red list of threatened species*. Version 2014. 2. <<http://www.iucnredlist.org>>. Downloaded on 20 October 2014.

